

SIAAIC - IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE: 6 MILIONI DI PERSONE NE SOFFRONO. 70/90% SENZA DIAGNOSI. I 10 “SEGNALI” DI ALLARME PER BAMBINI E ADULTI

Giunge al termine la quinta edizione della World Primary Immunodeficiency week (WPIW), la Settimana Mondiale dedicata alle immunodeficienze primitive (22-29 aprile)

Un individuo su 1200 può avere una di queste patologie Ecco i sintomi e i segnali cui prestare attenzione che ci aiutano ad ottenere una diagnosi precoce

I DATI - A livello globale circa 6 milioni di persone vivono con una forma di immunodeficienza primitiva (IDP) e si stima che circa un individuo su 1200 possa avere una di queste patologie. A sottolinearlo sono gli specialisti della **SIAAIC, Società Italiana Allergologia Asma e Immunologia Clinica**: secondo i dati, dal 70 al 90% degli individui che ne sono affetti non hanno ancora una diagnosi, a causa della mancanza di conoscenze, spiegano gli esperti, mentre gli operatori sanitari curano le infezioni frequenti come forme ricorrenti. Globalmente, più di 50 organizzazioni sono state costituite per combattere tali patologie, che complessivamente sono più di 250.

LA SETTIMANA DELLA SENSIBILIZZAZIONE - Giunge al termine la quinta edizione della *World Primary Immunodeficiency week (WPIW)*, la Settimana Mondiale dedicata alle immunodeficienze primitive (22-29 aprile), per sensibilizzare su queste patologie, spesso ancora non riconosciute. Lo slogan della manifestazione è **“Test. Diagnosi. Trattamento”** e i due focus centrali riguardano la diagnosi precoce e il trattamento ottimale per i pazienti.

COSA SONO LE IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE - Le *IDP* si presentano quando il sistema immunitario presenta dei deficit a livello della sua stessa funzione e si può manifestare attraverso infezioni frequenti, di cui a volte non si riconosce la causa: così, queste manifestazioni si ripresentano, talvolta indebolendo o danneggiando alcuni organi e provocando disabilità o addirittura causando il decesso. Al contrario, una diagnosi precoce e un adeguato trattamento possono migliorare le condizioni di salute dei pazienti, consentendo loro di vivere una vita piena e gratificante, evitando disabilità, controlli non necessari e talvolta molto lunghi nel tempo.

I DIECI SEGNALI D’ALLARME - Uno degli aspetti importanti da considerare riguarda i **10 segnali di attenzione** che possono far sospettare l’eventuale presenza di una immunodeficienza primitiva. Ecco i segnali forniti in occasione della *World Primary Immunodeficiency week* da [Immunodeficiency Canada](#)

Per i bambini e ragazzi fino a 18 anni

1. Quattro o più infezioni dell’orecchio nel corso di un anno
2. Due o più gravi infezioni ai seni nasali in un anno, in assenza di patologie allergiche
3. Due o più mesi di trattamento con antibiotico con scarsi risultati
4. Due o più polmoniti in un anno
5. Il bambino non riesce ad aumentare di peso o a crescere normalmente
6. Accessi ricorrenti e profondi alla cute o agli organi
7. Persistenti afte nella bocca o infezioni fungine sulla pelle
8. Necessità di ricorrere agli antibiotici per via endovenosa per combattere le infezioni
9. Due o più infezioni profonde inclusa sepsi
10. Storia familiare di immunodeficienza primitiva

Per gli adulti

1. Due o più infezioni dell’orecchio nel corso di un anno
2. Due o più gravi infezioni ai seni nasali in un anno, in assenza di patologie allergiche
3. Una polmonite all’anno, per più di un anno
4. Diarrea cronica con perdita di peso

5. Infezioni virali ricorrenti (raffreddore, herpes, verruche, condilomi)
 6. Frequente necessità di ricorrere ad antibiotici per via endovenosa per combattere l'infezione
 7. Ricorrenti e profondi ascessi alla cute o ad altri organi
 8. Necessità di ricorrere agli antibiotici per via endovenosa per combattere le infezioni
 9. Persistenti afte, infezioni fungine sulla pelle o su altri organi
 10. Storia familiare di immunodeficienza primitiva
-